

Роспотребнадзор предупреждает о профилактике инфекционных заболеваний в период весеннего паводка

Своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие на территории Кетовского, Белозерского районов Курганской области, в том числе позволяет предотвратить возникновение инфекционных заболеваний в период возможного ухудшения гидрологической обстановки.

Прививка доступная, безопасная и надежная защита от инфекционных заболеваний.

Вирусный гепатит А - это острое инфекционное заболевание, при котором поражается печень. Наиболее яркими признаками заболевания является желтушность склер и кожных покровов. В начале заболевания могут быть повышение температуры тела, слабость, недомогание, головная боль, боли в мышцах, снижение аппетита, тошнота, рвота, жидкий стул, боли в правом подреберье или в области желудка. Большинство случаев заражения гепатитом А происходит при употреблении воды или пищи, загрязненных вирусом, или же (особенно у детей) через грязные руки или игрушки. Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики гепатита А. Иммунизация проводится двукратно с интервалом в 6-12 месяцев. Поствакцинальный иммунитет обеспечивает защиту до 15-20 лет.

Туляремия - острое инфекционное заболевание, проявляющееся лихорадкой, общей интоксикацией, лимфаденитами (образованием бубонов), температурой 38-39 градусов, резкой головной болью и болью в мышцах (чаще в поясничной области и в икроножных мышцах). Чтобы защитить себя от инфекции, необходимо предупреждать появление в домах грызунов и своевременно их уничтожать: ставить приманки, ловушки и др. Следует защищать пищевые продукты, воду от загрязнения выделениями больных животных и не пренебрегать соблюдением правил личной гигиены. Основным методом профилактики туляремии является вакцинация. Прививать можно, начиная с семилетнего возраста. Уже через три - четыре недели у вакцинированных людей вырабатывается стойкий иммунитет на пять лет, далее необходимо проводить ревакцинацию.

Дизентерия - инфекционное заболевание, характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта, преимущественно толстой кишки. При заболевании развивается синдром общей интоксикации, боли в животе схваткообразного характера, многократная рвота и жидкий стул, повышением температуры тела, озноб, снижение аппетита. Основным путем передачи дизентерии является вода, источником инфекции является человек - больной или бессимптомный носитель. Наибольшее эпидемиологическое значение имеют больные легкой или стертой формой дизентерии, в особенности, имеющие отношение к пищевой промышленности и учреждениям общественного питания. Основным профилактическим мероприятием в данной группе «риска» по эпидемическим показателям в период паводка является вакцинация против дизентерии.

Заботиться о здоровье нужно всегда, а своевременная прививка - эффективный способ предотвращения заболеваний!